

Perico de Todd

Nombre científico:

Pyrrhura caeruleiceps

Autoridad taxonómica:

Todd, 1947

Phylum:

Chordata

Clase:

Aves

Orden:

Psittaciformes

Familia:

Psittacidae

Género:

Pyrrhura

Categoría:

En Peligro

Criterio:

B1ab(i,iii,v); C2a(i)

Nombres comunes:

perico de Todd, perico de Perijá, cotorra de Perijá, Todd's Parakeet, Perija Parakeet.

Notas Taxonómicas:

El perico de Perijá fue considerado como una subespecie de *Pyrrhura picta* durante mucho tiempo (Phelps Jr. y Meyer de Schauensee 1994). Recientemente se cuestionó su ubicación y se sugirió que las subespecies *caeruleiceps* y *pantchenkoi* juntas formaban una especie (Joseph 2000, Joseph y Stockwell 2002), tratamiento seguido por (Hilty 2003, Restall et al. 2007, del Hoyo y Collar 2014, del Hoyo et al. 2015). Los caracteres utilizados para describir *pantchenkoi* son débiles y se ha propuesto que no sea una subespecie diagnosticable (válida), aunque es alopátrida.

Descripción:

Perico pequeño, de unos 22 cm. Margen angosto detrás del pico y lados de la cabeza vino tinto, parte anterior de la corona y nuca azules, parte posterior de la corona pardo oscuro, auriculares

blancas. Pecho verde, plumas orilladas de franjas gruesas pálidas. Collar nual azul. Lomo y rémiges interiores verdes, centro de la parte baja del lomo rojo marrón en el centro. Hombros rojos, primarias y coberteras primarias azules, coberteras menores de abajo de las alas verdes, resto negruzco con tinte oliva. Cola roja, azul en la base ([Phelps Jr. y Meyer de Schauensee 1994](#), [Hilty 2003](#), [Restall et al. 2007](#)).

Distribución:

Zona tropical y subtropical de la sierra de Perijá, entre los 1200 y los 2000 m (*P. c. pantchenkoi*).

Situación:

Pyrrhura caeruleiceps es de distribución restringida a la sierra de Perijá, la cual se conoce por algunos ejemplares de museo y muy pocos registros de campo recientes. Su distribución conocida abarca unas decenas de kilómetros cuadrados, y la distribución potencial apenas cubre unos 3000 km² en Venezuela, con 5400 km² adicionales para la especie (subespecies *caeruleiceps* y *pantchenkoi*) en Colombia ([Botero-Delgado et al. 2012](#)). No debe ser muy abundante ya que durante varias salidas de campo no se obtuvo ningún registro. Se calcula su población global (ambas subespecies) en menos de 2500 individuos maduros ([BirdLife International 2015](#)), de los cuales menos de 1000 corresponderían a la población en nuestro país. En Colombia, se especula que podría estar En Peligro Crítico ([Botero-Delgado y Páez 2011](#)). En el ámbito internacional se considera En Peligro ([BirdLife International 2015](#)).

Amenazas:

Los bosques de Perijá se encuentran amenazados por la tala, la quema de la vegetación y la intensificación importante de actividades agrícolas, tanto de subsistencia como comerciales ([Lentino et al. 2005](#), [Rodríguez, J. P. et al. 2010](#), [López-O. et al. 2014](#)). Más de 70% de su hábitat ha sido transformado en Colombia ([Botero-Delgado et al. 2012](#)) y no existen datos para el lado de Venezuela. Es posible que esta especie, al igual que otros *Pyrrhura*, sea sensible a la fragmentación de su hábitat ([Botero-Delgado et al. 2013](#)). La población humana está en aumento, tanto por la colonización de inmigrantes del lado colombiano, como por el incremento de nacionales. La caza es una actividad común y algunos psitácidos han sido el blanco de cazadores. Es posible que los nidos sean objeto de explotación, pero no existen datos. No se sabe si *Pyrrhura caeruleiceps* es buscada como alimento o como ave de jaula.

Conservación:

La sierra de Perijá es importante por su gran diversidad, alto grado de endemismos tanto a nivel de especies como subespecíficos y por ser una de las prioridades mayores para la conservación de las aves en Venezuela ([Rodríguez, J. P. et al. 2004b](#)). Se han registrado 444 especies en la zona, siendo el área de más notable número de especies vulnerables ([Stattersfield et al. 1998](#)). Además, es un Área de Importancia para la Conservación de las Aves ([Lentino et al. 2005](#), [Rodríguez, J. P. et al. 2010](#)). Está protegida por el parque nacional Sierra de Perijá, el cual tiene una extensión de 2953 km², pero no cuenta con ningún tipo de manejo. Hay estudios para establecer nuevas áreas protegidas en el lado colombiano de la sierra de Perijá ([López-O. et al. 2014](#)), además del parque nacional natural Catatumbo-Barí, que se encuentra dentro de la Reserva de Los Motilones en Colombia. La importancia y valor de estos parques para la conservación aún está por determinar ([Lentino et al. 2005](#), [Rodríguez, J. P. et al. 2010](#)).

Ilustrador:

[Pigmalion's Workshop](#)

Autores:

Christopher J. Sharpe

Cita sugerida:

Sharpe, C. J. (2015). Perico de Todd, *Pyrrhura caeruleiceps*. En: J.P. Rodríguez, A. García-Rawlins y F. Rojas-Suárez (eds.) Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Cuarta edición. Provita y Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela. Recuperado de: animalesamenazados.provita.org.ve/content/perico-de-todd Jue, 20/06/2019 - 12:08

Creative Commons: